

Publicado en Seclaendosurgery.com (en línea) 2012, nº 40.

Disponible: http://seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=242

Copyright © Secla Endosurgery. Nº ISSN: 1698-4412

XI CONGRESO NACIONAL SECLA MADRID 2012 RESUMEN DE COMUNICACIÓN

Título:

Utilidad de la laparoscopia como herramienta diagnóstica/terapéutica en el cáncer de páncreas neuroendocrino metastásico y en el hepatocarcinoma

Autores:

Autor presentador:

Eduardo Díaz.

Resto de autores:

Ramón Puga; Benedetto Ielpo; Catalina Oliva; Isabel Fabra; Ricardo Carusso; Hipólito Durán; Yolanda Quijano; Emilio Vicente.

Institución:

Hospital Madrid Norte Sanchinarro

Resumen de comunicación:

Introducción:

La laparoscopia como abordaje quirúrgico sin apenas morbilidad se ha impuesto por su alta rentabilidad diagnóstica y/o terapéutica en múltiples patologías del aparato digestivo. El cáncer neuroendocrino de páncreas y el hepatocarcinoma son buenos ejemplos.

Objetivo:

Presentación de un vídeo que ilustra el abordaje laparoscópico como herramienta en las patologías expuestas en el título de la comunicación.

Material y método:

Dos casos clínicos.

Resultados:

Presentamos un varón de 54 años de edad diagnosticado de cáncer páncreas con metástasis múltiples bilobares en el hígado. El caso clínico se ilustra con un vídeo en el que mostramos la utilidad del abordaje laparoscópico combinado con la ecografía intraoperatoria laparoscópica del hígado para: 1- estadificación de la enfermedad hepática; 2- estadificación de la enfermedad en cavidad abdominal (presencia o no de carcinomatosis peritoneal); 3- toma de muestra de tejido hepático metastatizado para estudio inmunohistoquímico y molecular del espécimen (el primero permitió su catalogación como neoplasia endocrina, y el segundo el estudio de dianas terapéuticas y con ello una quimioterapia a "la carta"), y 4- tratamiento con radiofrecuencia de la metástasis hepática de mayor tamaño, por cierto, única que captaba en el PETTAC.

Presentamos también un varón de 47 años de edad con cirrosis conocida y un único hepatocarcinoma de 4,5cm de tamaño localizado entre los segmentos VI y VII. Nuevamente mostramos en el vídeo la utilidad del abordaje laparoscópico combinado con la ecografía

intraoperatoria laparoscópica del hígado para: 1-estadificación de la enfermedad hepática; 2- toma de muestra de tejido hepático no tumoral para mejor caracterización de la cirrosis hepática en un estudio anatomopatológico diferido del espécimen, y 3- tratamiento con radiofrecuencia del nódulo.

Conclusiones:

Discusión: es necesario introducir nuevas orientaciones que permite la laparoscopia en enfermedades oncológicas -hígado y páncreas-, que en muchas instituciones hospitalarias, por el estadio de la enfermedad, habrían seguido una orientación terapéutica convencional y con ello habrían privado al paciente de los siguientes beneficios: a)- en el primer caso, definir la naturaleza endocrina de la neoplasia y una quimioterapia a la carta merced a las dianas terapéuticas, y b)- en el segundo caso, obtener un control local de la enfermedad sin morbilidad, y duradero a medio plazo.