

Publicado en Seclaendosurgery.com (en línea) 2012, nº 40.

Disponible: http://seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=242

Copyright © Secla Endosurgery. Nº ISSN: 1698-4412

XI CONGRESO NACIONAL SECLA MADRID 2012 RESUMEN DE COMUNICACIÓN

Título:

LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO EN BANDA GÁSTRICA AJUSTABLE: ANÁLISIS DE RESULTADOS DE 132 PACIENTES INTERVENIDOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Autores:

Autor presentador:

Lago Oliver, Jesús

Resto de autores:

Vázquez Amigo S, Mercader Cidoncha E, Sanz Sánchez M, Pedraza Toledo G, Turégano Fuentes F

Institución:

Clínica Fuensanta. Madrid.

Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Madrid.

Resumen de comunicación:

Introducción:

La banda gástrica ajustable es una técnica afianzada en el mundo en el tratamiento de la obesidad mórbida. En España, las cifras de pacientes intervenidos de banda gástrica dista mucho de las cifras mundiales habiéndose alegado un alto número de reintervenciones, un alto porcentaje de conversiones a otra técnica y un alto porcentaje de fracaso terapéutico. Presentamos el análisis de nuestros resultados con 132 bandas intervenidas desde el año 2001 con resultados comparables a la literatura mundial y las causas que pueden justificar la diferencia en los resultados comunicados en España.

Objetivo:

Demostrar la importancia del seguimiento en los resultados de la banda gástrica ajustable laparoscópica

Material y método:

En el año 2001 iniciamos en actividad privada y pública, un programa de tratamiento quirúrgico de la obesidad mediante la implantación de banda gástrica ajustable. Paralelamente desarrollamos un sistema exhaustivo de seguimiento para evitar complicaciones y mejorar los resultados. Presentamos los resultados del seguimiento de los 132 pacientes intervenidos.

Resultados:

Desde el año 2001 hasta el 2011 hemos intervenido un total de 132 pacientes, 102 fueron mujeres y 30 hombres, con una edad media de 39 años y un BMI medio de 43 (rango 36-67). La comorbilidad más frecuente fue la dislipemia. Las intervenciones fueron realizadas por un solo cirujano mediante la técnica por pars flácida. El seguimiento fue superior a 5 años en 61 pacientes, en el resto el seguimiento medio fue de 44, 4 meses. La mortalidad y complicaciones graves fue 0.

SECLA

ENDOSURGERY

Ocho pacientes requirieron cirugía de revisión (6, 06%), 3 por complicaciones relacionadas con el reservorio, cuatro por deslizamiento y una por erosión. Tres deslizamientos fueron recidivantes y se convirtieron a otra técnica (2 by-pass gástrico y uno biliopancreático) y otro se resolvió con explante de la banda previa y colocación de una nueva banda de tipo Lap Band con retunelización posterior. El PSP medio se mantuvo en los pacientes con un seguimiento superior a los 5 años en 54, 8% en los pacientes intervenidos a partir del año 2006 con un seguimiento superior a 3 años en 59, 2% y en los intervenidos en los últimos 3 años con un seguimiento superior al año en 61,3%.

Conclusiones:

Los resultados de nuestra serie son superponibles a los publicados en la literatura mundial en nuestro medio y demuestran que reproduciendo el seguimiento realizado por el resto de los grupos mundiales, la banda gástrica es un método eficaz y seguro para el control del peso en los pacientes con obesidad mórbida también en España.