

Publicado en Seclaendosurgery.com (en línea) 2012, nº 40.

Disponible: http://seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=242

Copyright © Secla Endosurgery. Nº ISSN: 1698-4412

XI CONGRESO NACIONAL SECLA MADRID 2012 RESUMEN DE COMUNICACIÓN

Título:

BANDA GÁSTRICA AJUSTABLE. RESULTADOS A LARGO PLAZO

Autores:

Autor presentador:

Teresa Pozancos

Resto de autores:

M.González Zunzarren;G.Rodríguez Velasco;S.Conde;E.Mendia;R.Peromingo

Institución:

Cirugía General y Digestivo.Hospital Universitario Ramón y Cajal.Madrid. España

Resumen de comunicación:

Introducción:

La técnica de la banda gástrica ajustable es una técnica muy difundida en el ámbito de la cirugía bariátrica por su sencillez técnica y sus teóricas escasas complicaciones posoperatorias inmediatas.

Objetivo:

Evaluar los resultados de un programa de utilización de la banda gástrica en pacientes seleccionados con obesidad

Material y método:

Entre los años 2004 y 2008 fueron intervenidos 36 pacientes con un IMC medio de 42.1 K/m². Se excluyeron aquellos picoteadores y comedores de dulce.Se utilizó la técnica de pars flácida, iniciando la tolerancia oral a las 24 horas con alta, si era posible, a las 48 horas con dieta líquida y suplementos durante dos semanas.

Resultados:

La estancia media fue de 3 días (1-12). Se realizó una conversión a cirugía abierta. Una reoperación en el postoperatorio inmediato por sangrado. a 5 años el porcentaje de pérdida de exceso peso fue 37%.Como complicaciones tuvieron 5 deslizamientos de banda, 3 dilataciones y una rotación del puerto subcutáneo. Hasta la fecha ha habido 19 reintervenciones: 10 conversiones a bypass, 3 Sleeve, 5 Retiradas de banda y una recolocación del puerto subcutáneo.

Conclusiones:

En nuestro medio la banda gástrica ajustable, a pesar del estrecho seguimiento, se ha mostrado como una técnica ineficaz y con un alto número de reoperaciones en el seguimiento a largo plazo.