

Publicado en Seclaendosurgery.com (en línea) 2012, nº 40.

Disponible: http://seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=242

Copyright © Secla Endosurgery. Nº ISSN: 1698-4412

XI CONGRESO NACIONAL SECLA MADRID 2012 RESUMEN DE COMUNICACIÓN

Título:

Gastropexia laparoscópica por vólvulo recidivante

Autores:

Autor presentador:

G.Vigal Brey

Resto de autores:

L. Mionskowska, J.Fernández-Mallo, J.García Noval, D González Iglesias, Omar Abdel-Lah

Institución:

Hospital Comarcal De Jarrio, Coaña, Asturias

Resumen de comunicación:

Introducción:

La presencia de un vólvulo gástrico recidivante supone una merma importante en la calidad de vida así como causa de mortalidad en el caso de que el episodio cause isquemia en el órgano

Objetivo:

Presentar un video donde ofrecemos una gastropexia anterior por vía laparoscópica

Material y método:

Paciente de 83 con múltiples ingresos por vólvulo gástrico recidivante diagnosticado por gastroscopia que se consiguió desvolvular previamente gracias al propio endoscopio. Con el objetivo de evitar nuevos episodios de vólvulo se realiza una pexia a la cara anterior de pared abdominal mediante la colocación de dos puntos transparietales que fijan la cara anterior gástrica.

Resultados:

La intervención se llevó a cabo en quince minutos y el paciente fue alta al día siguiente del procedimiento. Hasta la fecha permanece asintomático

Conclusiones:

La realización de una pexia gástrica en paciente añoso cumple sobradamente con los criterios de mínima agresión quirúrgica para la resolución de un problema potencialmente grave