

Publicado en Seclaendosurgery.com (en línea) 2012, nº 40.

Disponible: [http://seclaendosurgery.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=260&Itemid=242](http://seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=242)

Copyright © Secla Endosurgery. Nº ISSN: 1698-4412

## XI CONGRESO NACIONAL SECLA MADRID 2012 RESUMEN DE COMUNICACIÓN

### Título:

TAPP en la hernia inguinal bilateral recidivada (Rutkov-Robbins y Shouldice)

### Autores:

Autor presentador:

S. Valderrabano Gonzalez

### Resto de autores:

C. González Gómez, M. Heras Garceau, Javier Salinas, L. Tresierra, J. Pintor Tortolero, M.A. Granado de la Fuente, J. Suárez Miguélez, J. A. González (Jefe de sección)

### Institución:

Unidad de Cirugía Esofagogástrica y Pared Abdominal. Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

### Resumen de comunicación:

#### Introducción:

Presentación de caso de reparación de hernia inguinal bilateral recidivada por laparoscopia sin conocimiento de la técnica realizada.

#### Objetivo:

Mostrar la utilidad de la cirugía laparoscópica en el reconocimiento de la técnica usada en la recidiva de la hernia inguinal.

#### Material y método:

Presentación en video de hernia inguinal bilateral recidivada.

#### Resultados:

Reconocimiento de técnica previa utilizada en reparación individualizada de la hernia inguinal de paciente con doble hernia inguinal, intervenidas por el mismo cirujano, en dos tiempos y con técnicas diferentes.

#### Conclusiones:

Reforzar la validez de la cirugía TAPP en el tratamiento de la hernia inguinal bilateral recidivada, para el reconocimiento de estructuras y técnicas previas usadas