Publicado en Seclaendosurgery.com (en linea) 2012, nº 40.
Disponible: http://seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=242
Copyright © Secla Endosurgery. Nº ISSN: 1698-4412

# XI CONGRESO NACIONAL SECLA
# MADRID 2012
# RESUMEN DE COMUNICACIÓN

Título:
MARSUPIALIZACION LAPAROSCÓPICA DE QUISTE RENAL POR ESTENOSIS DE LA UNION PIELO-URETERAL.

Autores:
Autor presentador:
ESTEFANIA ROMERO SELAS

Resto de autores:
RICARDO BRIME, INMACULADA FERNANDEZ, FERNANDO TEBA, ATANASIO FERNANDEZ, RAMON ARELLANO, LORENZO HERRERO, CARLOS OLIVIER

Institución:
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA. MADRID. ESPAÑA.

Resumen de comunicación:
Introducción:
El hallazgo de una imagen anecoica en ecografia o hipodensa en TAC sugiere contenido liquido y en general, lesiones benignas. Ante el hallazgo de una estenosis de la UPU que provoque uropatía obstructiva, el tratamiento de elección es la pieloplastia. Si se trata de quistes simples, solo se llega a la intervención quirúrgica en caso de que sean sintomáticos y otros procedimientos hallan fallado.

Objetivo:
Presentamos un caso de error al diagnóstico mediante pruebas de imagen que se resuelve de forma laparoscópica de una manera poco invasiva.

Material y método:
Presentamos el caso de un varón de 55 años con hallazgo de dilatación de la vía urinaria en ECO. Se completa el estudio con TAC y confirma uropatía obstructiva izquierda en relación con una estenosis de la UPU. Es programado para pieloplastia por vía laparoscópica, y durante la disección de la supuesta vía urinaria, se aprecia que dicha masa anecoica es un quiste simple intrasinusal que simula una pelvis dilatada y provoca cierta uropatía.Se procede a la marsupializacion del mismo, sin necesidad de manipular la vía urinaria.

Resultados:
El tiempo quirúrgico fue de 50 minutos. No se dejo drenaje. El alta fue en 24 horas con inmediata incorporación del paciente a su vida ordinaria. El paciente está asintomático y sin uropatía obstructiva.

Conclusiones:
El acceso quirúrgico laparoscópico ha permitido solventar el problema obstructivo de error diagnóstico de una manera sencilla y minimamente invasiva. La marsupialización laparoscópica es una excelente opción quirúrgica para el tratamiento de los Quistes Renales sintomáticos. Es un tratamiento sencillo y poco invasivo.