Publicado en Seclaendosurgery.com (en linea) 2012, nº 40.
Disponible: http://seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=242
Copyright © Secla Endosurgery. Nº ISSN: 1698-4412

XI CONGRESO NACIONAL SECLA
MADRID 2012
RESUMEN DE COMUNICACIÓN

Título:
REIMPLANTACIÓN URETERAL LAPAROSCÓPICA PSOAS HITCH POR ESTENOSIS IATRÓGENA E INFECCIOSA

Autores:
Autor presentador:
Alonso Prieto, M.A.

Resto de autores:
De Arriba Alonso, M. Ortiz Sanchez, L. Monagas Arteaga, S. García Díez, F. Flores Carbajal, J, Guerreiro González, R. Beneitez Alvarez, E. Gallo Rolania, FJ.

Institución:
Servicio de Urología, Complejo Asistencial Universitario de León, León, España

Resumen de comunicación:
Introducción:
Las principales causas de estenosis ureteral son la iatrogenia, y la patología infecciosa como la tuberculosis (TBC) genitourinaria, la cual es una enfermedad emergente que puede dar lugar a lesiones crónicas en la vía urinaria. Ammbos tipos de estenosis pueden ser abordadas laparoscópicamente con ventajas sobre la vía clásica abierta

Objetivo:
Presentar la técnica de reimplantación ureteral vía laparoscópica por estenosis secundaria a TBC y lesión iatrógena por cirugía ginecológica

Material y método:
Caso 1: Paciente varón de 65 años con estenosis del tercio distal del ureter izquierdo de 3 cm secundario a patología tuberculosa. Caso 2: Mujer de 45 años con estenosis y fistula uretero vaginal derecha secundaria a histerectomía laparoscopica. En ammbos casos se realiza un abordaje laparoscópico transperitoneal para conformar una vejiga psoica y anastomosis directa extravesical.

Resultados:
Retirada de catéter doble "j" en tres semanas en ambos casos, sin presentar datos de fístulas urinarias,

Conclusiones:
La cirugía laparoscópica se va aplicando cada vez a un mayor número de patologías siendo la cirugía reconstructiva donde más opciones pueden encontrar.