

**ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY
BRITISH JOURNAL OF SURGERY
SURGICAL ENDOSCOPY**

Junio – Julio – Agosto 2011

Jose A. Córdoba Sotomayor

Servicio de Cirugía General 1. Hospital Clínico San Carlos. Madrid



Ann Surg Oncol (2011) 18:1884–1890

DOI 10.1245/s10434-010-1530-1

Junio 2011

**Outcome of Laparoscopic Resection for Colorectal Cancer
in Patients with High Operative Risk**

Jensen T. C. Poon, MS, FRCSEd, Wai-Lun Law, MS, FRCS, FACS, Lorraine C. Y. Chow,

MBBS,

Joe K. M. Fan, MS, FRCSEd, and Siu-Hung Lo, MBBS, FRCSEd

RESUMEN

Antecedentes. Existe la preocupación general de que los pacientes de alto riesgo son mas susceptibles a los efectos del neumoperitoneo y a menudo se les niega la cirugía laparoscópica. Este estudio analizó el impacto de la cirugía laparoscópica colorrectal en pacientes de alto riesgo quirúrgico, definido éste como ASA 3 y 4.

Métodos. Fueron incluidos en el estudio 335 pacientes de manera consecutiva sometidos a cirugía tanto por técnica abierta como laparoscópica. Tanto las características de los pacientes y del tumor como los resultados quirúrgicos se recogieron de manera prospectiva, con comparación entre los dos grupos.

Resultados. En comparación con la cirugía abierta, los pacientes por laparoscopia tuvieron menor estancia hospitalaria (8 [6-12] vs 6 [4-9] días; P