

DISCREPANCIA EN EL RECUENTO DE GASAS Y COMPRESAS TRAS CONVERSIÓN EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

□

Autores: Carlos Martín Trapero, Iván Mansilla García, M^a Angeles Esquivias Tallada, Fátima González Fernández, Elena Manzano Martín, Jorge Benítez Rodríguez, Cristina Chulbi Tello.

Centro: □ Bloque Quirúrgico. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Correspondencia con: Carlos Martín Trapero. Bloque Quirúrgico. 3^a Planta. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. C/ Martín Lagos s/n. 28040. Madrid.

Email: cmartint.hcsc@salud.madrid.org

CITAR COMO:

Carlos Martín Trapero, Iván Mansilla García, M^a Angeles Esquivias Tallada, Fátima González Fernández, Elena Manzano Martín, Jorge Benítez Rodríguez, Cristina Chulbi Tello.

DISCREPANCIA EN EL RECUENTO DE GASAS Y COMPRESAS TRAS CONVERSIÓN EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

Seclaendosurgery.com (en línea) 2012, nº 41.

Disponible en Internet: http://www.seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=328&Itemid=342

ISSN: 1698-4412

Resumen

Introducción y objetivos

El olvido de gasas y/o compresas tras una cirugía es considerado un efecto adverso prevenible. Se han apuntado como factores de riesgo la obesidad, la cirugía de urgencia y los cambios de planes. La conversión de un procedimiento iniciado por laparoscopia es considerado por ello como un factor de riesgo.

El **objetivo** de este trabajo es analizar la discrepancia en el recuento de gasas y/o compresas en cirugía laparoscópica abdominal en los que ha sido necesaria la conversión a cirugía abierta.

Métodos

Estudio prospectivo observacional en pacientes en los que el procedimiento se inicia por laparoscopia siendo necesario convertir a cirugía abierta. La variable principal es la discrepancia en el recuento. Como variables independientes tenemos el tiempo empleado en la cirugía en minutos, el número de gasas y compresas utilizado, el índice de masa corporal (IMC), el cambio de enfermeras en el procedimiento y el carácter de la cirugía (electiva o urgente). Se comparan las medias mediante test t de Student y las variables cualitativas se analizan mediante el test de la Chi cuadrado. Se estableció un valor para p